

Messages clés

La plupart des adultes atteints de diabète de type 2 chez qui une alimentation équilibrée et l'exercice ne suffisent pas à maîtriser l'hyperglycémie devraient suivre les consignes suivantes :

- Amorcer un traitement par voie orale avec la metformine.
- Adjoindre une sulfonylurée à la metformine lorsque cette dernière est incapable de maîtriser convenablement l'hyperglycémie en monothérapie.
- Adjoindre l'insuline Neutral Protamine Hagedorn (NPH) lorsque la metformine jumelée à une sulfonylurée ne peut maîtriser convenablement l'hyperglycémie.*

OR

Adjoindre un inhibiteur de la dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) à la bithérapie metformine + sulfonylurée dans les rares cas où l'insuline n'est pas indiquée.

Optimiser la posologie du produit à chaque étape du traitement avant de passer au suivant. Il convient d'encourager un régime d'alimentation et d'exercice sains à chaque étape.

*Les patients qui éprouvent des épisodes d'hypoglycémie prononcée lorsqu'ils tentent d'atteindre leur taux optimal d'hémoglobine glyquée (HbA1c) avec l'insuline NPH auraient avantage à opter pour un analogue de l'insuline à action prolongée (c.-à-d. l'insuline glargine ou détémir).


Pour de l'information complète sur le projet fondé sur des données probantes, veuillez consulter le site Web de l'ACMST au WWW.CADTH.CA/T2DM-FR

Avis de non-responsabilité : Cette information ne peut remplacer le conseil médical ou les soins prodigués par un professionnel de la santé. L'ACMST n'est pas responsable des dommages de l'utilisation, à bon ou à mauvais escient, des renseignements explicites ou implicites retrouvés dans ce document.

Juillet 2013



COÛTS QUOTIDIENS DES TRAITEMENTS SANS BANDELETTES DE TEST



Source – Liste du régime d'assurance médicamenteuse de l'Ontario (pour tous les médicaments sauf exceptions telles qu'indiquées);
 * Source – Régime public d'assurance-médicament du Québec;
 † Source – Régime public d'assurance-médicament de la Saskatchewan;
 ‡ Présentation du fabricant

- Les coûts énoncés sont ceux des versions génériques (si commercialisées) et ne tiennent pas compte de la majoration en pharmacie ou des frais d'ordonnance.
- Les frais quotidiens de traitement grimpent lorsqu'on y joint les bandelettes de test de glycémie.